

# Sífilis y el embarazo

## ¿Que necesitas saber?



### ¿Sabías que?

- La sífilis puede causar serios problemas de salud para usted y su bebé.
- Ha habido un gran aumento en el número de bebés que nacen con sífilis en los Estados Unidos y en Montana.
- La buena noticia es que puede proteger a su bebé evitando infecciones, haciéndose la prueba de sífilis durante el embarazo y siguiendo el tratamiento indicado si la prueba da positivo.

### ¿Qué le puede pasar a mi bebé?

- La sífilis no tratada puede causar un aborto espontáneo (pérdida del bebé durante el embarazo), prematuridad (un bebé que nace antes de tiempo), bajo peso al nacer o la muerte poco después del nacimiento.
- Los bebés que nacen con sífilis también pueden tener huesos deformados, conteo sanguíneo bajo, órganos agrandados, ceguera o sordera y otros problemas de salud.

### ¿Cómo sé si tengo sífilis?

- Puedes tener sífilis y no saberlo. Muchas personas no tienen síntomas.
- Los síntomas de la sífilis pueden ser muy leves y similares a los de otras condiciones de salud.
- La prueba es la única forma de estar seguro de si hay infección por sífilis.

### ¿Cómo puedo obtener ayuda?



Si necesita ayuda para acudir a una clínica para someterse a pruebas o recibir tratamiento, póngase en contacto con el departamento de salud pública de su localidad y hable con su médico.



**MONTANA**  
PUBLIC HEALTH INSTITUTE

### Estoy embarazada, ¿qué debo saber?

- Hágase la prueba de la sífilis en su primera visita prenatal.
- Si está embarazada y tiene sífilis, puede transmitir la infección al feto.
- Una infección por sífilis no detectada durante el embarazo puede hacer que su bebé nazca antes de tiempo, provocar defectos congénitos o hacer que nazca muerto.
- Si le preocupa una infección por sífilis de una nueva pareja o una reinfección durante el embarazo, póngase en contacto con su médico para que le haga las pruebas.
- Si da positivo en las pruebas de sífilis durante el embarazo, es muy importante que complete el tratamiento recomendado para la salud de su bebé.

### ¿Qué puedo hacer?

- Hágase la prueba de la sífilis la primera vez que acuda al médico para recibir atención sanitaria durante el embarazo.
- Si no se hace la prueba en la primera visita, pregunte a su médico si puede hacérsela en la próxima revisión.

### ¿Qué pasa si doy positivo?

- Si das positivo en la prueba de la sífilis, recibe tratamiento y protégete a ti mismo y a los demás.
- Si recibe tratamiento, pero su pareja no, usted corre el riesgo de volver a contraer la sífilis.
- Si das positivo, es crucial que tu(s) pareja(s) sexual(es) se haga(n) la prueba y reciba(n) tratamiento para evitar volver a infectarse.

### ¿Cómo puedo protegerme de la sífilis?

- Puede reducir el riesgo de contraer sífilis evitando las relaciones sexuales sin protección (relaciones sexuales sin preservativo).
- Algunas formas de protegerse son mantener relaciones sexuales únicamente con una persona que se haya sometido a pruebas de detección de sífilis y otras ETS, y utilizar preservativos de látex de la forma correcta cada vez que se mantengan relaciones sexuales.