

# Prevención de la sífilis congénita

## Una guía para los médicos que brindan atención directa

La epidemia de sífilis de Montana es grave y se está extendiendo, siendo la sífilis congénita una de las consecuencias sanitarias más graves. Afortunadamente, la enfermedad se puede prevenir y tratar.

La detección y el tratamiento de los pacientes y sus parejas son fundamentales para limitar la propagación. La falta de pruebas y de tratamiento puede provocar enfermedades graves que alteren la vida, discapacidad o muerte. Para ello, el DPHHS recomienda lo siguiente:

- Los proveedores deben examinar a todas las pacientes embarazadas para detectar sífilis. Se recomienda la detección triple durante el embarazo entre las poblaciones de alto riesgo (p. ej., visita inicial, 28 semanas de gestación, parto).
- Cualquier mujer que no haya recibido atención prenatal antes del parto o que tenga un mayor riesgo de contraer sífilis durante el embarazo debe tener documentados los resultados de una prueba serológica antes del alta.
- La penicilina G parenteral es el único antimicrobiano efectivo conocido para tratar la infección fetal y prevenir la sífilis congénita.

El cuidado posnatal del bebé es fundamental, especialmente para individuos de alto riesgo.

- Los profesionales que atienden a los recién nacidos deben preguntar sobre los antecedentes de infección por sífilis materna y documentar los tratamientos anteriores.
- La evaluación postnatal y el manejo de los recién nacidos de madres con sífilis no tratada o tratada inadecuadamente son cruciales.
- Toda mujer que presente una muerte fetal después de las 20 semanas de gestación debe someterse a pruebas de sífilis

El tratamiento es efectivo, pero a menudo requiere un seguimiento significativo y trabajo en equipo.

- El tratamiento eficaz de la sífilis depende de la estadificación precisa de la enfermedad.
- No basta con recetar a su paciente. El tratamiento de la pareja es fundamental para detener la reinfección del paciente y otras transmisiones.
- La gestión eficaz de los pacientes y sus parejas puede requerir la participación de recursos clínicos no tradicionales (por ejemplo, trabajadores sanitarios de la comunidad) para un seguimiento eficaz, en particular para el tratamiento de la enfermedad latente tardía.
- La colaboración entre los proveedores de atención médica, la salud pública y las organizaciones comunitarias que atienden a las poblaciones vulnerables es fundamental para un tratamiento eficaz y para frenar la propagación.
- Todos los casos de sífilis deben informarse a los funcionarios locales de salud pública de inmediato para garantizar el inicio oportuno de la investigación del caso.

El apoyo para los proveedores de atención médica está disponible.

- Consulte el Llamado a la Acción adjunto para obtener más información sobre las pruebas, el tratamiento y el seguimiento en Montana.
- Para consultas clínicas, apoyo y otros recursos, los proveedores también pueden comunicarse con **Centro de Capacitación para la Prevención de ETS de la Universidad de Washington**: <https://www.uwptc.org/consults>.
- Las pautas nacionales actualizadas para la detección, el tratamiento y el seguimiento de la sífilis se pueden encontrar en el **sitio web de la Sífilis del CDC**.
- **Las Pautas para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual**, 2021, del CDC brindan orientación actualizada sobre el tratamiento y el seguimiento de la sífilis.
- **Guía de bolsillo sobre sífilis para proveedores**, publicada por el CDC.
- Comuníquese con la Dra. Maggie Cook-Shimanek en [margaret.cook-shimanek@mt.gov](mailto:margaret.cook-shimanek@mt.gov) si tiene preguntas adicionales.

